



# Dier-en-Nieuws

April, 2010

Dierenartsenpraktijk Schagen



## Bescherming konijnen tegen myxomatose en VHD

Dierenartsenpraktijk Schagen organiseert in april en mei weer meerdere vaccinatiedagen voor konijnen. Aanmelding kan telefonisch of via het [aanmeldformulier](#) op onze website.

bijvoorbeeld kooien en drinkflesjes. Ook vers geplukt gras kan besmet zijn, zeker op plaatsen waar wilde konijnen komen. Na een



incubatietijd van 1-3 dagen kunnen de eerste symptomen optreden. Het konijn wordt depressief, eet niet meer, raakt benauwd, krijgt koorts, schreeuwt en tandenknarst. In het laatste stadium van de ziekte zie je vaak schuimige bloederige neusuitvloeiing. Meestal sterft het konijn snel aan bloedingen in het lichaam. Deze bloedingen treden met name op in de darmen. Het zijn deze bloedingen waaraan de ziekte zijn naam heeft te danken: hemorragisch betekent bloed. De ziekte gaat echter niet altijd gepaard met bloedingen. Er is ook een vorm waarbij het konijn plots dood neervalt zonder eerst andere symptomen te hebben vertoond.

*Meer informatie vindt u op [www.dapschagen.nl](http://www.dapschagen.nl).*

*Auteur: Gerty Speelman*

### In deze uitgave:

Myxomatose en VHD bij konijnen	1
Klantenkaart	2
Teken-Update	2

Er zijn 2 veel voorkomende virusinfecties bij het konijn: **Myxomatose** en **VHD (=RHD)**. Deze virusziektes hebben helaas bijna altijd een dodelijke afloop. Er is geen goed werkende therapie, daarom is voorkomen door een vaccinatie zo belangrijk!

Een konijn kan met myxomatose besmet worden via muggen, mijten en de konijnenvlo. De ziekte begint meestal met ooguitvloeiing en een vieze neus. Later ontstaan knobbels (myxomen) op de kop, romp en rond de staart. De dieren eten niet en krijgen koorts. Binnen enkele dagen gaan de dieren dood. Een goede therapie bestaat niet. Slechts zelden overleeft het dier deze nare aandoening. Konijntjes kunnen vanaf 1 maand oud gevaccineerd worden. Het beste kan dit in april/mei, voordat de stekende insecten verschijnen. De bescherming houdt ongeveer 2- 4 maanden aan, het is daarom aan te raden om in augustus/september te vaccinatie te herhalen.

**VHD** verspreidt zich via direct contact tussen konijnen, maar ook via mest, insecten en besmet materiaal zoals



## Dierenartsenpraktijk Schagen

Noord 3—Schagen

Oosterdijk 34 - Dirkshorn

Zeeweg 44 - Callantsoog

Telnr: 0224—213527

E-mail: [info@dapschagen.nl](mailto:info@dapschagen.nl)

[www.dapschagen.nl](http://www.dapschagen.nl)

## Klantenkaart Dierenartsenpraktijk Schagen

Met de klantenkaart van Dierenartsenpraktijk Schagen spaart u op alle produkten voor gezelschapsdieren zoals diervoeders, middelen tegen wormen en vlooien voor een korting van 5%. Ook geldt de korting voor behandelingen en medicijnen. Meer informatie vindt u op onze [website](#) of vraag er naar bij een volgend bezoek.

## Teken-Update

Teken worden de laatste jaren een steeds groter probleem. Niet alleen neemt hun aantal jaarlijks toe, ook wordt er steeds meer gewaarschuwd voor ziekten die door teken overgebracht kunnen worden. Het meest bekend is de Ziekte van Lyme. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de Borrelia-bacterie die via het speeksel van de teek op mens en dier wordt overgedragen. De symptomen van een besmetting zijn koorts, kreupelheid, nierfalen en hersenvliesontsteking.

In Nederland komt de Ixodus Ricinus teek veel voor. Zo'n 10% van deze teken is besmet met de Borrelia-bacterie, die de ziekte van Lyme veroorzaakt. De teek wordt op zijn beurt weer besmet door muizen en vogels.

De Dermacentor-teek lijkt zich permanent in ons land te hebben gevestigd. Deze teek kan Babesiose veroorzaken ook wel

tekenkoorts genoemd. Deze parasiet veroorzaakt bloedarmoede, koorts, geelzucht en bloed in de urine. De tijd tussen besmetting en de eerste ziekteverschijnselen is 1 à 2 weken.

Een derde soort is de Rhipicephalus sanguines, afkomstig is uit de zuidelijke landen. Deze teek weet zich al jarenlang in Nederlandse woningen te handhaven. Hij kan voor honden gevaarlijke ziektes als Babesiose en Ehrlichiose overbrengen. Bij Ehrlichia wordt ook de rode bloedcel aangetast met koorts, sloomheid, slechte eetlust en bloedarmoede tot gevolg.

Met het voorkomen van een tekenbesmetting kan een de kans op een nare ziekte verkleinen. Hiervoor kunnen pipetten voor in de nek (Frontline combo, Practic, en Pulvex) worden gebruikt. Ook is er een

tekenband beschikbaar (Scalibor). Een aangehechte teek sterft binnen een aantal uren en heeft daardoor onvoldoende tijd besmet speeksel uit te wisselen met uw dier.

Mocht uw dier toch een teek hebben dan is die eenvoudig van de huid verwijderen met behulp van een tekentang. Belangrijk is nooit een teek te verdoven voor hem te verwijderen. De teek gaat hierdoor braken waardoor er eventueel besmet tekenspeeksel in het bijtmondje komt. Met de O'tom tekentang is zowel een kleine als een volgezogen eenvoudig te verwijderen.

*Auteur: Gerty Spielman*



*Ixodus Ricinus*